

SSIPPE dotazník pro screening ADHD (Short screening instrument for psychological problems in enuresis)		
jméno:		r. č.
<b>Emoční problémy</b> Pokud více než dvě kladné odpovědi, nutné psychologické vyšetření		
1. Má <b>někdy</b> dítě pocit, že se k němu okolí špatně chová?		ANO NE
2. Cítí se <b>někdy</b> dítě bezcenně a nejistě?		ANO NE
3. Bolí jej <b>někdy</b> hlava?		ANO NE
4. Cítí se <b>někdy</b> špatně?		ANO NE
5. Stěžuje si <b>někdy</b> dítě na bolesti břicha?		ANO NE
6. Je dítě <b>někdy</b> málo aktivní a bez energie?		ANO NE
7. Cítí se <b>někdy</b> dítě nešťastně a smutně?		ANO NE
<b>Porucha pozornosti</b> Pokud více než dvě kladné odpovědi, nutné psychologické vyšetření		
1. Vykazuje <b>často</b> dítě nedostatečnou pozornost k detailům a má problémy pozornosti ve škole?		ANO NE
2. Má dítě <b>často</b> problémy s organizací svých povinností a činností?		ANO NE
3. Zapomíná dítě <b>často</b> v běžném denním provozu?		ANO NE
<b>Hyperaktivita / impulzivita</b> Pokud více než dvě kladné odpovědi, nutné psychologické vyšetření		
1. Mluví dítě <b>často</b> bez přestávky?		ANO NE
2. Je dítě <b>často</b> „zanepřázdňené“?		ANO NE
3. Pobíhá či leze po věcech <b>často</b> v situacích, kdy se to nehodí?		ANO NE

**Obr. 2.** Česká verze SSIPPE dotazníku (14)

**Fig. 2.** The Czech version of the SSIPPE questionnaire (14)

anatomické vady meatu uretry; je charakterizován malým únikem moče krátce po mikci, příp. záněty pochvy

- **giggle inkontinence:** postihuje především dívky; je charakterizována částečným či úplným vyprázdněním měchýře při smíchu, nebývá spojena s nočním pomočováním; může být spojena se skrytou hyperaktivitou měchýře
- **Infekce močových cest** se často pojí se zácpou a s poruchami vyprazdňovací funkce měchýře – dysfunkčním a odkládaným močením; u febrilních stavů nutno předpokládat přítomnost vezikoureterálního refluxu
- **Chronická zácpa**
- **Organické postižení močové trubice či pánevního dna** (strikтура či stenóza uretry, chlopeč zadní uretry, postižení pánevního dna u minimální formy anorektální malformace – perineální píštěle, stav po rekonstrukci močového měchýře)
- **Neurogení postižení** – manifestovaný či okulturní spinální dysrafismus, syndrom kaudální regrese aj.
- **Poruchy spánku** (výrazné chrápání, periodické pohyby končetin)

#### ■ Diabetes mellitus/diabetes insipidus

#### ■ Psychologicko-psychiatrická porucha:

20–30 % pacientů s rezistentní enurézou má některou z „F“ diagnóz dle mezinárodní klasifikace nemoci ICD-10, nejčastěji se jedná o ADHD, převažuje forma poruchy pozornosti (ADHD-IA)

#### Doporučení

Dětský urolog nebo nefrolog vychází z již realizovaných vyšetření, provede je však dle potřeby znovu. Podrobně projde anamnézu (event. použije dotazník), doplní po poučení aktuální pitnou a mikční kartu, záznam nočního pomočení a frekvence stolice, zopakuje fyzikální vyšetření, vyšetření moči, provede USG ledvin a močového měchýře, uroflowmetrii a v případě potřeby doplní vyšetření specializovaná (UFM s EMG, cystografie, uretrocystografie, cystoureteroskopie s ev. kalibrací močové trubice).

#### Anamnéza

**Osobní** – perinatální období, závažnější choroby, úrazy, operace, neurologická onemocnění, poruchy spánku, chrápání, gynekologické problémy u dívky.