

# ADENOKARCINOM SIGMOIDÁLNÍ AUGMENTACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Adenocarcinoma of sigmoid bladder augmentation

Jan Schraml<sup>1,2</sup>, Martina Chodacká<sup>2</sup>, Marek Broul<sup>1</sup>, Petra Hokůvová<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Klinika urologie a robotické chirurgie, Masarykova nemocnice, o.z., KZ, a. s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

<sup>2</sup>Uroonkologický tým Komplexního onkologického centra, Masarykova nemocnice, o.z., KZ, a. s., Ústí nad Labem

Došlo: 20. 3. 2018

Přijato: 13. 7. 2018

## Kontaktní adresa:

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Klinika urologie a robotické chirurgie, Masarykova nemocnice, o.z., KZ, a.s.

Sociální péče 12a

401 13 Ústí nad Labem

e-mail: jan.schraml@kzcr.eu

**Střet zájmů:** žádný

## Prohlášení o podpoře:

Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.

## SOUHRN

Schraml J, Chodacká M, Broul M, Hokůvová P. Adenokarcinom sigmoidální augmentace močového měchýře.

Autoři referují o případu ženy, která podstoupila v 21 letech augmentaci močového měchýře pomocí detubulizovaného segmentu sigmatu pro recidivující ulcerózní cystitidy. Léčba byla úspěšná, pacientka žila zcela normální plnohodnotný život, včetně úspěšného průběhu těhotenství s následným porodem per vias naturales. Pacientka neměla

žádné urologické problémy a urologickou péči vyhledala až v 54 letech pro opakující se infekce dolních močových cest.

Vyšetření prokázalo nádor v augmentované části močového měchýře. Přesto, že se jednalo o níže diferencovaný adenokarcinom G3, podařilo se nádor radikálně odstranit a resekovanou část nahradit detubulizovaným ileálním štěpem. Pacientka je nyní osm měsíců po výkonu zcela bez obtíží, bez recidivy, provádí čistou intermitentní katetrizaci s občasnou spontánní mikcí, je kontinentní a pravidelně dispenzarizována uroonkologickým týmem.

Kazuistika je dokladem nutné pravidelné a trvalé dispenzarizace pacientů, kteří podstoupili rekonstrukční urologickou operaci s použitím střevního štěpu.

## KLÍČOVÁ SLOVA

Augmentace močového měchýře, detubulizovaný segment sigmatu, ulcerózní cystitida, nádor augmentované části močového měchýře, níže diferencovaný adenokarcinom, čistá intermitentní katetrizace.

## SUMMARY

Schraml J, Chodacká M, Broul M, Hokůvová P. Adenocarcinoma of sigmoid bladder augmentation.