

Tab. 2. Srovnání symptomů dolních močových cest**Tab. 2.** Comparison of lower urinary tract symptoms

Srovnání symptomů dolních močových cest					
	předoperačně	3 měsíce po operaci	p-hodnota	1 rok po operaci	p-hodnota
IPSS skóre	N 170	N 170		N 139	
průměr	23	6,1		6,9	
medián	22	6,9	< 0,001	7	< 0,001
min–max	6–30	0–21		7–18	
IPSS QoL	N 170	N 170		N 139	
průměr	4	1		1,2	
medián	4	1,1	< 0,001	1,3	< 0,001
min–max	1–6	0–4		0–3	
OABv8 skóre	N 170	N 170		N 139	
průměr	18,4	6,2		7,2	
medián	17	5,4	< 0,001	6	< 0,001
min–max	5–40	1–23		4–19	

Tab. 3. Srovnání nálezů průtoku moči, vymočeného a reziduálního objemu moči a doby močení**Tab. 3.** Comparison of uroflowmetry, voided and post void residual volume and time of micturition

Srovnání nálezů průtoku moči					
	předoperačně	3 měsíce po operaci	p-hodnota	1 rok po operaci	p-hodnota
Q_{max} (ml/sec)	N 166	N 166		N 139	
průměr	6,2	21,1		18,1	
medián	6,9	19	< 0,001	17,3	< 0,001
min–max	1,0–18,6	2,0–36,4		7,2–29,3	
Q prům (ml/sec)	N 166	N 166		N 139	
průměr	3,2	10,1		9,2	
medián	3,0	9,8	< 0,001	8,9	< 0,001
min–max	1,0–12,6	1,0–19,8		3,2–17,6	
V (ml)	N 166	N 166		N 139	
průměr	185	285,7		270	
medián	170	251	< 0,001	289	< 0,001
min–max	3–520	45–620		129–480	
PMR (ml)	N 166	N 166		N 139	
průměr	147	21		12	
medián	125	0	< 0,001	0	< 0,001
min–max	0–760	0–373		0–118	
T (sec)	N 166	N 166		N 139	
průměr	52	31		33,2	
medián	45	26,3	0,073	29,3	0,079
min–max	7–125	12–83		17–92	