



**Obr. 1.** Strangulace zevního genitálu kovovým prstenem

**Fig. 1.** A penoscrotal strangulation by a metallic ring



**Obr. 2.** Strangulace zevního genitálu kovovým prstenem – pohled perineum

**Fig. 2.** A penoscrotal strangulation by a metallic ring – perineal view



**Obr. 3.** Lopatka dle Martina

**Fig. 3.** Spatula Martin



**Obr. 4.** Uvolňování prstenu pomocí brusky

**Fig. 4.** Releasing of the ring with a grinder



**Obr. 5.** Přerušovaný kovový prsten

**Fig. 5.** The metallic ring cut in two pieces

Mezi nejčastější předměty způsobující strangulaci zevního genitálu patří kovové kroužky, vážnější postižení genitálu jsou však prokázána u nekovových předmětů. Většinou dochází k umístění kroužku jen na penis, zavzetí celého genitálu není tak časté.

Pacienti, kteří vyhledají ošetření po více než 72 hodinách od vzniku strangulace, čelí riziku těžkého a nevratného postižení. Strategie extrakce cizích těles ze zevního genitálu závisí na typu použitého předmětu, době od vzniku strangulace, schopnosti pacienta zachovat klid během zákroku a vybavenosti lékaře pro tyto situace. Cizí tělesa je možné přerušit pomocí kleští či pil