


Tab. 2. Stratifikace nemocných dle kardiovaskulárního rizika na základě 2. a 3. princetonského konsenzu – upraveno dle EAU guidelines (1)

Tab. 2. Stratification of patients by cardiovascular risk factors based on 2nd and 3rd Princenton consensus – as per EAU guidelines (1)

Nízké riziko	Střední riziko	Vysoké riziko
Asymptomatický pacient < 3 rizikové faktory onemocnění koronárních tepen (kromě pohlaví)	≥ 3 rizikové faktory onemocnění koronárních tepen (kromě pohlaví)	Vysokorizikové arytmie
Mírná stabilní angina pectoris (AP) (vyšetřen a léčen)	Středně závažná, stabilní AP	Nestabilní nebo rekurentní AP
Po nekomplikovaném infarktu myokardu (IM)	Recentní IM (> 2, < 6 týdnů)	Recentní IM (< 2 týdny)
Porucha funkce levé komory, kongestivní kardiální selhání (NYHA I nebo II)	Porucha funkce levé komory, kongestivní kardiální selhání (NYHA III)	Porucha funkce levé komory, kongestivní kardiální selhání (NYHA IV)
Po úspěšné revaskularizaci koronárních tepen	Non-kardiální následky aterosklerózy (CMP, onemocnění periferních cév)	Kardiomyopatie
Korigovaná hypertenze		Nekorigovaná hypertenze
Mírná chlopenní vada		Střední až závažná chlopenní vada



Obr. 1. Algoritmus vyšetření pacienta s erektilní dysfunkcí – upraveno dle EAU guidelines (1)

Fig. 1. An algorithm of diagnostic evaluation in patients with ED – as per EAU guidelines (1)