

Cysty předkožky u dětí

Foreskin cysts in children

Ivo Novák¹, Peter Kuliaček¹, Zuzana Svobodová¹, Aleš Ryška², Václav Stejskal²

¹Urologická klinika – dětské oddělení, FN a LF UK, Hradec Králové

²Fingerlandův PAU, FN a LF UK, Hradec Králové

Došlo: 2. 8. 2023

Přijato: 12. 9. 2023

Kontaktní adresa:

MUDr. Ivo Novák, Ph.D.

Urologická klinika – dětské oddělení, FN a LF UK

Sokolská 451

500 05 Hradec Králové

e-mail: novakivo11@seznam.cz

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Článek, ani jeho části, nebyly dosud literárně publikovány. Článek nebyl podpořen grantem ani firemně, nemá žádný konflikt zájmů.

SOUHRN

Novák I., Kuliaček P., Svobodová Z., Ryška A., Stejskal V. Cysty předkožky u dětí.

Autoři prezentují retrospektivní rozbor klinického souboru 6 chlapců s cystami předkožky, kteří byli operováni na pracovišti v letech 2017–2022. Věk chlapců byl v době diagnostiky 2–11 let (medián 5 let). U všech chlapců byla provedena excize cystické léze na předkožce velikosti 5–22 mm (medián 6,5 mm). Histologické vyšetření potvrdilo ve všech případech diagnózu benigní cysty (2× mukoidní cysty s cylindrickým a kubickým epitelem, 2× epidermoidní cysty, 2× prosté cysty s cylindrickým a přechodním epitelem). Klinické, funkční a kosmetické výsledky operace byly u všech dobré. Pooperační hojení probíhalo

u všech nekomplikovaně. Nebyla nutná žádná další chirurgická léčba. Na pooperační ambulantní kontrole byli všichni chlapci zhojeni a postupně mohli být vyřazeni z dalšího klinického sledování.

KLÍČOVÁ SLOVA

Cysty, chlapci, léčba.

SUMMARY

Novák I., Kuliaček P., Svobodová Z., Ryška A., Stejskal V. Foreskin cysts in children.

The authors present a retrospective clinical group analysis of 6 boys with foreskin cysts. They were operated on in our department in 2017–2022. The boys' age was 2–11 years (median 5 years) at the time of diagnosis. All boys underwent excision of a foreskin cystic lesion measuring 5–22 mm (median 6.5 mm). Histological examination of the excised tissue confirmed several benign cysts in all cases (2× mucoid cysts with cylindrical epithelium, or cuboidal epithelium, 2× epidermoid cysts, 2× simple cysts with cylindrical, or transitional epithelium). The clinical, functional, and cosmetic results of the surgery were good for all boys. The postoperative healing was uncomplicated for all boys. No further surgical treatment was required. At the postoperative outpatient follow-up, all boys were healed and they could be discharged from further clinical follow-up.

KEY WORDS

Cysty, boys, therapy.