

Monocryl 4-0. Páskový drén. Krevní ztráta žádná. Délka celého výkonu 113 minut.

Dle kontrolního pooperačního nefrogramu dislokace stentu do proximální části ureteru. Plánovaná výměna stentu deset dní od reimplantace s následným odstraněním nefrostomie neúspěšná, nepodařilo se znovu zavést stent ascendentně ani descendentně. Ponechána tedy nefrostomie.

Nefrostomogram měsíc po reimplantaci, ureter průchodný, bez extravazace (Obr. 8). Pět dní po nefrostomogramu již úspěšně zaveden ascendentně uretrální double loop stent a odstraněna nefrostomie. Stent odstraněn cystoskopicky 3 měsíce od reimplantace. CT IVU necelý měsíc po odstranění stentu s normálním nálezem. Šest měsíců od operace zcela bez obtíží.

LITERATURA

1. Hlaváčová J, Jambura J, Kouba J, et al. Časná chirurgická léčba poranění ureterů. *Ces Urol.* 2011; 15(3): 158–66.
2. Hora M, Stránský P, Eret V, et al. Laparoskopická reimplantace ureteru – video. *Ces Urol.* 2016; 20(2): 97–9.
3. Macek P, Fanta M, Pešl M, et al. Varianty laparoskopické reimplantace močovodu. *Ces Urol.* 2017; 21(1): 16–9.
4. Schraml J, Broul M, Šámal V, Hlavička M. Roboticky asistovaná reimplantace močovodu. *Ces Urol.* 2022; 26(4): 256–8.
5. Schraml J, Hora M, Hlavička M, Broul M. Pravostranná robotická reimplantace močovodu s Boariho lalokovou plastikou. *Ces Urol.* 2020; 24(4): 244–6.



Soutěž ČUS 2023 o nejlepší video publikované v časopise Česká urologie

Soutěž ČUS



Všechna videa publikovaná v časopise Česká urologie v roce 2023 budou do soutěže zařazena automaticky. Podmínkou zařazení je, že první autor bude urolog.

Vítězné práce budou vyhlášeny na Výroční konferenci ČUS 2023.

Následně budou výsledky zveřejněny v časopisu Česká urologie a na webových stránkách ČUS.