

Tab. 2. Sumarizace 5letého přežití bez recidivy dle metastáz v reg. mizních uzlinách a srovnání podskupin dle rozsahu nádoru, postižení uzlin a odpovědi na chemoterapii

Table 2. Summary of 5-year recurrence-free survival by metastases in the regional lymph nodes and comparison of subgroups according to tumor extent, lymph node involvement and response to chemotherapy

Přežití bez recidivy	Bez metastáz v reg. mizních uzlinách (cN0)		Metastázy v reg. mizních uzlinách (cN1–3)	
	n	5leté přežití (95% IS)	n	5leté přežití (95% IS)
Všichni pacienti	49	82,7 % (72,4; 94,4)	51	40,3 % (28,2; 57,7)
Podskupiny				
Rozsah nádoru cT2	23	86,7 % (73,8; 100,0)	16	34,4 % (15,6; 75,6)
Rozsah nádoru cT3–4	26	79,0 % (64,1; 97,3)	35	40,8 % (26,9; 61,9)
Rozsah postižení uzlin cN1	—	—	26	44,3 % (27,7; 71,1)
Rozsah postižení uzlin cN2–3	—	—	25	36,0 % (20,8; 62,2)

IS – interval spolehlivosti

Obr. 1. Přežití bez recidivy dle přítomnosti metastáz v reg. mizních uzlinách (log rank test statistické významnosti rozdílu mezi skupinami: $p < 0,001$)

Fig. 1. Recurrence-free survival according to the presence of metastases in regional lymph nodes (log rank test of statistical significance of the difference between groups: $p < 0.001$)

