




Obr. 6. Sagitální CT scan s pravostrannou ureterokélou a mnohočetnými konkrementy

Fig. 6. Sagital CT scan with the right ureterocele and multiple stones




Obr. 7. Pravostranná ureterokéla obsahující mnohočetné konkrementy během ureteroskopie

Fig. 7. Right ureterocele containing multiple stones during ureteroscopy



Obr. 8. Mnohočetná pravostranná nefrolitiáza a flexibilní ureterorenoskop

Fig. 8. Multiple right nephrolithiasis and a flexible ureterorenoscope



Obr. 9. Konkrementy odstraněné během flexibilní ureterorenoskopie

Fig. 9. The stones removed during flexible ureterorenoscopy

pro zhoršený přístup přes PUJ ukončen zavedením double pig-tailu 6/20. Výkon v antibiotickém krytí a po přípravě po domluvě s hematologi (mírná deficeience faktoru IX), délka 92 minut, bez komplikací.

S odstupem pěti týdnů byla provedena re-endoskopie, re-discize ureterokély a flexibilní ureteroskopie

s extrakcí reziduální nefrolitiázy vpravo (Obr. 9). Vnitřní stent nezaváděn, ponechán na 48 hodin ureterální katétr a moč. katétr. Výkon opět v antibiotickém krytí a po hematologické přípravě, délka výkonu 42 minut. Celkem při obou procedurách odstraněno 37 konkrementů. Dle rozboru se jednalo o kalciumoxalát mo-