





Obr. 12. Karcinom penisu, barveno imunohistochemicky protilátkou proti p53, A – nulový fenotyp, zvětšeno 20×, B – wild type exprese, zvětšeno 20×, C – difuzní silná pozitivita p53 v jádrech buněk invazivního karcinomu a v prekanceróze v povrchovém epitelu, zvětšeno 20×, D – difuzní silná jaderná pozitivita p53 v nádorových buňkách s wild-type expresí v přilehlém nenádorovém epitelu, zvětšeno 10×

Fig. 12. Penile carcinoma, stained immunohistochemically with an antibody against p53, A – null phenotype, magnified 20×, B – wild type expression, magnified 20×, C – diffuse strong p53 positivity in the nuclei of invasive carcinoma cells and in precancer in the surface epithelium, magnified 20×, D – diffuse strong p53 nuclear positivity in tumor cells with wild-type expression in adjacent non-neoplastic epithelium, magnified 10×



Obr. 13. Vliv p53 na OS a CSS, A – Kaplan-Meierova křivka ukazující negativní prognostický význam mutovaného profilu p53 na celkové přežití, B – Aalen-Johansenova křivka ukazující dopad profilu p53 na nádorově specifické přežití (15)

Fig. 13. Impact of p53 on OS and CSS, A – Kaplan-Meier curve showing the negative prognostic significance of the mutated p53 profile on overall survival, B – Aalen-Johansen curve showing the impact of the p53 profile on cancer specific survival (15)