

ZÁVĚR

Léčba everolimem představuje další možnost konzervativní léčby pro pacienty s oboustrannými AML nebo AML v solitární ledvině, které nejsou jinak řešitelné.

Svým kauzálním působením v patogenezi AML snižuje objem nádoru, který zůstává hlavním z rizi-

kových faktorů krvácivých příhod. Potenciálně též může redukcí objemu umožnit následný resekční výkon. Dosud však existuje omezené množství dat prokazujících snížení rizika krvácivých příhod. Nejedná se o standardní postup, avšak u jinak neřešitelného postižení přináší další možnost léčebného ovlivnění se zachováním renálního parenchymu.

LITERATURA

1. **Ürge T, Pitra T, Chudáček Z, et al.** Nové trendy v léčbě renálního angiomyolipomu. *Ces Urol.* 2015; 19(2): 106–117.
2. **Citak EC, Yilmaz EB, Yaman E, et al.** Malignant epitheloid angiomyolipoma of the kidney in a child treated with sunitinib, everolimus and axitinib. *Can Urol Assoc J.* 2015; 9(7–8):E542–5.
3. **Paldus V, Šámal V, Mečl J.** Wunderlichův syndrom – soubor pacientů s netraumatickým spontánním krvácením do retroperitonea. *Ces Urol.* 2019; 23(3): 230–236.
4. **Bocková J, Kuldan R.** Spontánní ruptura renálního angiomyolipomu. *Ces Urol.* 2017; 21(2): 172–175.
5. **Geynisman DM, Kadow BT, Shuch BM, et al.** Sporadic Angiomyolipomas Growth Kinetics While on Everolimus: Results of a Phase II Trial. *J Urol.* 2020; 204(3): 531–537.
6. **Lee L, Ito T, Jensen RT.** Everolimus in the treatment of neuroendocrine tumors: efficacy, sideeffects, resistance, and factors affecting its place in the treatment sequence. *Expert Opin Pharmacother.* 2018 Jun; 19(8): 909–928.
7. **Bissler JJ, Kingswood JC, Radzikowska E, et al.** Everolimus long-term use in patients with tuberous sclerosis complex: Four-year update of the EXIST-2 study. *PLoS One.* 2017; 12(8): e0180939.
8. **Luo C, Ye WR, Zu XB, et al.** Low-Dose Everolimus Maintenance Therapy for Renal Angiomyolipoma Associated With Tuberous Sclerosis Complex. *Front Med (Lausanne).* 2021; 8: 744050.