

Adenokarcinom urachu u mladého pacienta

Urachal adenocarcinoma in a young patient

Juraj Beniak¹, Kamil Belej^{1,3}, Marie Nováková², Miroslav Záleský¹

¹Urologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha

²Oddělení patologie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha

³Urologické pracoviště, Nemocnica Bory, Bratislava

Došlo: 14. 3. 2024

Přijato: 5. 5. 2024

Kontaktní adresa:

MUDr. Juraj Beniak, FEBU
Urologická klinika 1. LF UK a ÚVN,
Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
e-mail: beniak.ju@gmail.com

Střet zájmů: Žádný.

Podpora: Práce byla podpořena institucionální podporou Ministerstva obrany (DZRVO-MO1012).

SOUHRN

Beniak J, Belej K, Nováková M, Záleský M. Adenokarcinom urachu u mladého pacienta.

Prezentujeme vzácný případ symptomatického karcinomu urachu u mladého pacienta, který na našem pracovišti podstoupil chirurgickou excizi tumoru a je v remisi. Jedná se o vzácnou diagnózu, na kterou je ale potřeba při vyšetření pacienta s hematurií myslet.

KLÍČOVÁ SLOVA

Cystektomie, karcinom, resekce, urachus.

SUMMARY

Beniak J, Belej K, Nováková M, Záleský M. Urachal adenocarcinoma in a young patient.

We present a case of a young patient with a symptomatic urachal carcinoma. The patient underwent surgical resection at our department and is now in remission. Urachal cancer must be considered when examining a patient with visible hematuria.

KEY WORDS

Cystectomy, carcinoma, resection, urachus.

.....

ÚVOD

Urachus je vazivový pruh spojující vrchol měchýře s pupkem, v průběhu embryogeneze bývá obliterován a přeměněn na ligamentum umbilicale medianum. Asi u třetiny pacientů nezanikne úplně a v jeho průběhu se můžou objevit různé anomálie – perzistující urachus, cysta urachu, sinus urachu či vezikourachální divertikl (1, 2, 3).

Karcinom urachu je velmi vzácné onemocnění (0,01 % všech nádorů v dospělém věku, 1 % nádorů močového měchýře) a je častější u mužů. Vyskytuje se nejčastěji ve věku 52–59 let, obecně postihuje