




Obr. 1. CT vyšetření zobrazuje expanzi ve vrcholu měchýře s cystickou a také solidní intraluminální složkou

Fig. 1. CT scan shows a tumor in the dome of the bladder with cystic and solid components




Obr. 2. Peroperační snímek solidního nádoru vrcholu měchýře se zbytkem urachu

Fig. 2. Tumor in the dome of the bladder with urachus


nalo se o stadium IIIA dle stagingového systému urachálních karcinomů dle Sheldona, okraje resekce byly negativní. Adjuvantní terapie nebyla onkologem indikována.

Pacient je 20 měsíců po operaci dispenzarizován urologem i onkologem, jsou prováděné



Obr. 3. Detail papilární složky tumoru s intraluminální propagací do měchýře

Fig. 3. Bladder part of the tumor (papillary lesion)



Obr. 4. Histologický detail z preparátu: přechod urotel – karcinom (s nekrotickou, cysticky změněnou složkou)

Fig. 4. Pathology specimen: normal urothelium and adjacent carcinoma

pravidelné CT a cystoskopické kontroly. Pacient je v celkové remisi a bez klinických obtíží.

U pacienta byla při genetickém vyšetření (na doporučení onkologa) prokázána heterozygotní mutace BRCA1 genu a byl doporučen genetický screening u rodinných příslušníků.